

# Hasonlítsa össze termékeinket



**Voltaren Emulgel 1% gél (HU) masszázss fejjel**

**Voltaren Emulgel 1% gél**

**Voltaren Emulgel Forte**

**Voltaren Dolo**

**Voltaren ActiGo**

## FORMÁLÁSI

Gél

Gél

Gél

Lágy kapszula

Gyógyszeres tapasz

## MIRE HASZNÁLJAM

A Voltaren Emulgel 1% gél számos, az ízületeket és az izmokat érintő fájdalmas folyamat esetén csökkenti a fájdalmat, a gyulladást és a duzzanatot.

A Voltaren Emulgel 1% gél számos, az ízületeket és az izmokat érintő fájdalmas folyamat esetén csökkenti a fájdalmat, a gyulladást és a duzzanatot.

A Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél az ízületek és az izmok fájdalommal járó elváltozásai esetén enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást.

A Voltaren Dolo 25 mg lágy kapszula enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, a hátfájást, fejfájást, fogfájást és a menstruáció következtében fellépő fájdalmakat, a megfázás, illetve influenza tüneteit (beleértve az izomfájdalmakat és a torokfájást), valamint csökkenti a lázat.

A kar- és lábsérülések következtében (pl. sportsérülések) kialakuló zúzódások, rándulások, ficamok, húzódások okozta fájdalom helyi tüneti és rövidtávú kezelésére felnőttek és 16 évnél idősebb serdülők számára.

## ELŐNYÖK

- A masszázss fejnek köszönhetően nincs többé ragacos kéz, csak célzott fájdalomcsillapítás.

- Fehér
- kellemes illatú
- hűsítő hatású gél

- Akár 12 órás fájdalomcsillapítás, mely könnyen nyitható kupakkal is elérhető (150 grammos kiszerelemben) az ízületi gyulladással betegek számára.

- A lágy kapszula gyógyszerforma a Voltaren Dolo tablettánál gyorsabb felszívódást tesz lehetővé.

- Egyesével csomagolt
- Ultravékony
- Száraz tapintású

## HASZNÁLAT IDEJE

Felnőtteknek és 14 éves vagy annál idősebb serdülőknek: A Voltaren Emulgel 1% gélt naponta 3-4 alkalommal kell alkalmazni a fájdalmas területen. Ne használja a Voltaren Emulgel 1% gélt orvosi javaslat nélkül: Felnőttek és 14 éves vagy annál idősebb serdülők: • 2 hétnél hosszabb ideig izom és ízületi sérülések (rándulás, húzódás, ütés), illetve íngyulladás kezelésére.

Felnőttek (18 éves vagy annál idősebbek): • 3 hétnél tovább ízületi gyulladás kezelésére.

Hosszabb kezelést a kezelőorvos javasolhat. Forduljon kezelőorvosához, amennyiben a fájdalom, vagy a gyulladás 7 napon belül nem javul, esetleg fokozódik.

Felnőtteknek és 14 éves vagy annál idősebb serdülőknek: A Voltaren Emulgel 1% gélt naponta 3-4 alkalommal kell alkalmazni a fájdalmas területen. Ne használja a Voltaren Emulgel 1% gélt orvosi javaslat nélkül: Felnőttek és 14 éves vagy annál idősebb serdülők: • 2 hétnél hosszabb ideig izom és ízületi sérülések (rándulás, húzódás, ütés), illetve íngyulladás kezelésére. Felnőttek (18 éves vagy annál idősebbek): • 3 hétnél tovább ízületi gyulladás kezelésére.

Hosszabb kezelést a kezelőorvos javasolhat. Forduljon kezelőorvosához, amennyiben a fájdalom, vagy a gyulladás 7 napon belül nem javul, esetleg fokozódik.

Orvosi javaslat hiányában ne használja a Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gélt: Felnőttek és 14 évnél idősebb serdülők: • 2 hétnél hosszabb ideig izom és ízületi sérülések (rándulás, húzódás, ütés), illetve íngyulladás, Felnőttek (18 év felett): • 3 hétnél tovább ízületi gyulladás kezelésére.

Hosszabb kezelést a kezelőorvos javasolhat. Forduljon kezelőorvosához, amennyiben a fájdalom, vagy a gyulladás 7 napon belül nem javul, esetleg fokozódik.

Fájdalom enyhítésére 5 napnál, láz csökkentésére 3 napnál tovább ne alkalmazza.

A készítményt ne alkalmazza 7 napnál tovább. Forduljon kezelőorvosához, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Ha a Voltaren ActiGo hatását túl erősnek vagy túl gyengének találja, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

## AKTÍV HATÓANYAG

11,6 mg diklofenák-dietilamin 1 gramm gélben.

11,6 mg diklofenák-dietilamin 1 gramm gélben.

23,2 mg diklofenák-dietilamin 1 gramm gélben.

25 mg diklofenák-kálium lágy kapszulánként.

140 mg diklofenák-nátriumot tartalmaz tapaszonként.

## ELÉRHETŐ KISZERELÉSEK

A masszázss fejjel ellátott Voltaren Emulgel 1% gél 75 grammos kiszerelemben kapható.

A Voltaren Emulgel 1% gél 50 g-os, 75 g-os (applikátorral) és 100 g-os kiszerelemben kapható.

A Voltaren Emulgel Forte 50 g-os, 100 g-os és 150 g-os kiszerelemben kapható.

A Voltaren Dolo lágy kapszula 20 db-os kiszerelemben kapható.

A Voltaren ActiGo 5 db gyógyszeres tapasz tartalmazó kiszerelemben kapható.