

Hasonlítsa össze termékeinket!



Voltaren Emulgel Forte



Voltaren Emulgel 1%



Voltaren gyógyszeres tapasz



Voltaren Dolo



Voltaren Dolo Rapid

Formátum	gél	gél	tapasz	tabletta	lágycapszula
Felhasználási terület	Az ízületek és az izmok fájdalommal járó elváltozásai esetén enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Izom és ízületi sérülések (pl. rándulások, húzódások, zúzódások, hátfájás, sportsérülések), íngyulladás (pl. teniszkönyök) esetén - duzzanat a könyök és a térd körül - csökkenti a fájdalmat. Közepes és erős fájdalom esetén is javítja a betegek mozgékonyágát és segíti a szokásos mindennapi tevékenységhez történő visszatérést.	Az ízületeket és az izmokat érintő fájdalmas folyamat esetén csökkenti a fájdalmat, a gyulladást és a duzzanatot. Felnőttek és 14 éves vagy annál idősebb serdűlők: izom és ízületi sérülések (pl. rándulások, húzódások, zúzódások, hátfájás), íngyulladás (pl. teniszkönyök). Felnőttek (18 éves vagy annál idősebbek): a térd és az ujjak enyhe ízületi gyulladása.	A kar- és lábsérülések következtében (pl. sportsérülések) kialakuló zúzódások, rándulások, ficamok, húzódások okozta fájdalom helyi tüneti és rövidtávú kezelésére felnőttek és 16 évnél idősebb serdűlők számára.	Fájdalomcsillapító hatású és csökkenti a gyulladást (duzzanatot) és a lázat is. Enyhíti az izom és ízületi fájdalmakat, a hátfájást, fejfájást, fogfájást és a menstruáció következtében fellépő fájdalmakat és a megfázás, illetve influenza tüneteit (beleértve az izomfájdalmakat és a torokfájást), valamint csökkenti a lázat.	Fájdalomcsillapító hatású és csökkenti a gyulladást (duzzanatot) és a lázat is. Enyhíti az izom és ízületi fájdalmakat, a hátfájást, fejfájást, fogfájást és a menstruáció következtében fellépő fájdalmakat és a megfázás, illetve influenza tüneteit (beleértve az izomfájdalmakat és a torokfájást), valamint csökkenti a lázat.
Alkalmazás	Naponta 2 alkalommal (reggel és este), így tartós fájdalomcsillapítást nyújt, akár 12 órán át.	Naponta 3-4 alkalommal kell alkalmazni a fájdalmas területen.	A készítmény ajánlott adagja egy gyógyszeres tapasz naponta egyszer.	A panaszok megjelenése esetén kezdő adagként 1 db bevont tablettát. Amennyiben szükséges, a továbbiakban 4-6 óránként 1 db bevont tablettát. 24 óra alatt legfeljebb 3 db bevont tablettát (75 mg) vehető be.	A panaszok megjelenése esetén kezdő adagként 1 db bevont tablettát. Amennyiben szükséges, a továbbiakban 4-6 óránként 1 db bevont tablettát. 24 óra alatt legfeljebb 3 db bevont tablettát (75 mg) vehető be.
Hatóanyag	diklofenák-dietilamin	diklofenák-dietilamin	diclofenac sodium	diklofenák-kálium	diklofenák-kálium
Kiszárelés	50g, 100g, 150g	50g, 100g	5 db	20 db	20 db, 30 db